Pinella bianca

Vass6R07s186-190



Collection Vassal-Montpellier

1268Mtp2

Pinella bianca

5.41810

blone, sperque















V4

- ne pg. 5, 6

ANNEE 1989 EMPLACEMENT 5-11 S10
6 Rg 7 s186. 190 NOM Pinella bianca 126802 Débourrement Nbra début mi/déb grap Floraison Véraison début mi/f fin début mi/f fin Ferti-Nbre Souche yeux lité Maturité 3 D 83 133. Port : Migueur : Mill. 1 6 13.3.89 -5

1932 ANNEE												
NOM Pinella Cianea EMPLACEMENT 5 11 5 10 × 1268. Hali 6R7 4186.190												
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin		mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5 5	2	133	16.3 ×	***************************************	Pour : Baie :	TG - disc-s r : B- : s -	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1	Dim: bov-cyl dus ox - he	l-fus : inc		: L - M- C

olomical de la company de la c

Désignation :

4

Pinella Cianca

Emplacement :

5. 11 \$10 A.S

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 0 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 84

Année 2005

V4

Code cépage : 1268-2

Code clone

Nom cépage : Pinella bianca

Observateur: 8L

Emplacement: 6 R7 186 130

domination de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición del composición de la composición del com

5.11810

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte7.

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 en liseré 2 - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3-

cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 movenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1) - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup.: blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282) - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218)

très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 23] - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Désignation : Emplacement : Pinella Cianea. 5.11 \$10 farming the

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année : 2005

- forte ou très forte 3.

V4

Observateur: SZ

Code cépage :

Code clone

Nom cépage : Pinella branca

Emplacement: 6 R7 186, 190 5 = forde; 5-11 8 10 1 tie faid.

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3)- horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

Couleur non

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1)- présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1- moyenne 5 - forte 9.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1- moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - moyenne 2

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 1- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm 3) moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1- au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée (2.)

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.

Couleur des vrilles : verte 260 - jaune 261 - rouge 262 et 263.

No ordre

Dasignation VASSAL Planche côté nº FEUILLE ADULTE 34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3. Vace supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 52 velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 3 limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3/entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - Long 1 - moyen (2) court 3. 39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3. - angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3) - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 83

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 1899

Observateur

Code cépage : 1268

٧4

Code clone: 02 Nom cépage : Pinella branca

Emplacement: 5.11510
6 R7 186.190 Joseph Server

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire (1)- elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie(1)- côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1)- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence T)- présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5- grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 / faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens(2) - saillants 3

prime 3 viguen 3

N° d'ordre: 1268.02 Désignation: Puiella branca Emplacement: 6 R 7 S 186.190

4

: 1 -2)- 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L1/L : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - (36) - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - (7) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Nbre dents du point pét. à L3 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : (63) - (64) - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

alanteelootaalaataalaataal

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92